

BERICHT INFECTIEZIEKTEN NIET-ACUTE ZORG



Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers

COVID-19 Algemeen

In regio Brabant-Zuidoost zien we op dit moment een zeer sterke stijging in het aantal besmettingen, met name in de leeftijdscategorie van 15 – 30 jaar. Regio Brabant-Zuidoost is nu ingeschaald in risiconiveau 'ernstig'.

Naar aanleiding van het 117^e OMT advies is het beleid rondom bron- en contactonderzoek gewijzigd. Er wordt nu onderscheid gemaakt in personen die wel en die niet immuun zijn.

In deze nieuwsbrief staat meer informatie over de epidemiologie van de besmettingen die we nu zien, het nieuwe protocol bron- en contactonderzoek en de isolatieduur bij een Covid-19 positief getest persoon.

1

Toename Corona besmettingen

In korte tijd is het aantal besmettingen helaas zo sterk toegenomen dat onze regio weer in het risiconiveau 'ernstig' wordt ingeschaald. Gemiddeld krijgen we dagelijks ruim 200 nieuwe meldingen binnen. In week 27 zagen wij een stijging in het aantal besmettingen van ongeveer 600% ten opzichte van de week ervoor. Ook landelijk is deze stijging te zien.

In de periode van 1 t/m 10 juli was 82% van de besmettingen in onze regio te zien in de leeftijdsgroep van 15 tot 30 jaar. Maar ook in de oudere leeftijdsgroepen zien wij nu een stijging in het aantal besmettingen. Gelukkig is er op dit moment nog geen stijging te zien in het aantal ziekenhuisopnames. Ook zien we nog geen stijging in het aantal besmettingen binnen zorginstellingen.

Vanwege de zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen en de inschaling in risiconiveau 'ernstig' willen wij nogmaals het belang benadrukken van het preventief dragen van mondneusmaskers door medewerkers binnen instellingen voor langdurige zorg. We hebben signalen gekregen dat er zorginstellingen zijn, waar medewerkers niet meer preventief een mondneusmasker dragen. Wij adviseren om dit te heroverwegen.

Door de snelle toename van het aantal besmettingen is het Bron- en Contactonderzoek bij de GGD Brabant-Zuidoost de afgelopen dagen afgeschaald. Hierdoor is het zicht op mogelijke clusters bemoeilijkt.

Wij vragen u om een cluster binnen uw zorginstelling te melden (artikel 26 melding) aan: infectieziekten@ggdbzo.nl.

Vragen over de maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van Corona besmettingen kan u aan ons team stellen: vtcorona@ggdbzo.nl.

Bron- en Contactonderzoek (instellingen voor langdurige zorg)

Per 8 juli zijn er een aantal wijzigingen ingegaan voor het bron- en contactonderzoek (BCO). De aanleiding is dat steeds meer mensen volledig gevaccineerd zijn. Daarnaast is er steeds meer bewijs dat vaccinatie niet alleen beschermt tegen ziekte, maar ook de transmissie van het virus vermindert.

In het nieuwe protocol voor het BCO wordt onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn en personen die niet immuun zijn voor Covid-19. Dit is van invloed op de adviezen rondom testen, isolatie en quarantaine. Onderstaande wijzigingen gelden ongeacht de vaccinatiegraad binnen een instelling. Wel kan er bij een lage vaccinatiegraad (<80%) overwogen worden om binnen die locatie minder versoepelingen door te voeren.

De LCI richtlijnen '[Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg](#)' en '[Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis](#)' zijn aangepast naar het nieuwe beleid.

Definitie immuun en niet immuun


Personen worden beschouwd als 'immuun' als zij voldoen aan één van onderstaande criteria:

- De volledige vaccinatieserie ≥ 14 dagen geleden afgerond;
- ≥ 14 dagen geleden (minimaal) 1 vaccinatie ontvangen na COVID-19 doorgemaakt;
- COVID-19 doorgemaakt met een eerste ziektedag (of bij asymptomatisch: testdatum) < 6 maanden geleden (ongeacht wel of niet daarna gevaccineerd).

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt iemand als 'in principe' immuun gezien. Er bestaat echter nog steeds een (kleine) kans dat iemand die als immuun wordt gezien, toch besmet raakt en ook besmettelijk kan zijn voor anderen.

2

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt deze persoon als niet immuun beschouwd. Onderstaand stroomschema kan gebruikt worden om te bepalen of iemand immuun of niet immuun is.



Maatregelen voor bewoners/ cliënten die contact zijn

Onderstaand wordt weergegeven wat het beleid is bij bewoners/ cliënten wanneer zij contact hebben gehad met een positief getest persoon.

Type contact	Niet-immuun contact	Immuun contact
Huisgenoten (cat.1)	<ul style="list-style-type: none"> Z.s.m. testen Quarantaine 10 dagen Testen op dag 5* Testen bij klachten 	<ul style="list-style-type: none"> Z.s.m. testen Thuisblijven 10 dagen (gebruikelijke onderlinge contacten binnen woning/afdeling zijn wel mogelijk) Testen dag 5* Testen bij klachten
Overig nauw contact (cat. 2)	<ul style="list-style-type: none"> Z.s.m. testen Quarantaine 10 dagen** Testen op dag 5 Testen bij klachten 	<ul style="list-style-type: none"> Testen op dag 5 Testen bij klachten
Overig niet nauw contact (cat. 3)	<ul style="list-style-type: none"> Alleen in bijzondere situaties (in overleg met de GGD): informeren en testadvies 	<ul style="list-style-type: none"> Alleen in bijzondere situaties (in overleg met de GGD): informeren en testadvies

* Indien de test op dag 5 negatief is, kan de quarantaine opgeheven worden.

** Indien quarantaine een uitzonderlijk grote belasting vormt voor een client/bewoner, kan voor die client/bewoner gekeken worden welke maatregelen proportioneel zijn in verhouding tot het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus. Cliënten/bewoners nemen in ieder geval gedurende 5 dagen niet deel aan groepsactiviteiten met kwetsbare personen buiten de eigen groep/afdeling.

Maatregelen voor zorgmedewerkers die contact zijn

3

Hieronder wordt weergegeven wat het beleid is wanneer zorgmedewerkers contact hebben gehad met een positief getest persoon.

Type contact	Niet-immuun contact	Immuun contact
Huisgenoten (cat.1)	<ul style="list-style-type: none"> Z.s.m. testen Quarantaine 10 dagen Testen op dag 5* Testen bij klachten 	<ul style="list-style-type: none"> Testen dag 5* Testen bij klachten Dragen chirurgisch mondneusmasker tenminste type II tijdens het werk t/m dag 10
Overig nauw contact (cat. 2)	<ul style="list-style-type: none"> Z.s.m. testen Quarantaine 10 dagen Testen op dag 5* Testen bij klachten 	<ul style="list-style-type: none"> Testen op dag 5* Testen bij klachten Dragen chirurgisch mondneusmasker tenminste type II tijdens het werk t/m dag 10
Overig niet nauw contact (cat. 3)	<ul style="list-style-type: none"> Alleen in bijzondere situaties (in overleg met de GGD): informeren en testadvies 	<ul style="list-style-type: none"> Alleen in bijzondere situaties (in overleg met de GGD): informeren en testadvies

*Indien de PCR test op of na dag 5 negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. De zorgmedewerker draagt dan wel nog t/m dag 10 een chirurgisch mondneusmasker tenminste type II tijdens het werk.

Thuisblijfadvisie huisgenoot met klachten

Wanneer een medewerker een huisgenoot heeft met coronagerelateerde klachten én koorts of benauwdheid, geldt er geen advies meer om thuis te blijven in afwachting van de testuitslag van zijn/haar huisgenoot. Wij adviseren wel om preventief een medisch mondneusmasker te dragen tot de uitslag van de huisgenoot bekend is.

Isolatiebeleid na een positieve Coronatestuitslag

Ook in het isolatiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn en personen die niet immuun zijn. De isolatieperiode bij immune medewerkers zonder klachten is verkort omdat zij minder virus verspreiden.

Klachten	Niet-immuun persoon	Immuun persoon
Positief getest zonder klachten	Isolatie tot en met dag 5 na de testdatum. (Testdatum is dag 0)	Isolatie tot en met de 3e dag na de testdatum. Bij een verminderde afweer (immuungecompromitteerd) is de isolatieduur 5 dagen na de testdatum.
Positief getest met klachten	Minimaal 7 dagen isolatie én 24 uur klachtenvrij én 48 uur koortsvrij. Bij aanhoudende (milde) klachten wordt de isolatieduur verlengd tot maximaal 14 dagen. Bij een verminderde afweer (immuungecompromitteerd) is de isolatieduur 14 dagen. Zie voor een uitgebreid overzicht de tabel isolatieduur in de LCI richtlijn	

Let op: indien een asymptomatisch positief getest persoon binnen de oorspronkelijke isolatieduur alsnog klachten ontwikkelt, wordt het beleid voor de symptomatische indexen aangehouden en gaat de isolatie opnieuw in vanaf het moment van het ontstaan van de klachten.

Aandachtspunten i.v.m. privacywetgeving

Bovenstaande beleid, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen immuun en niet immuun, kan mogelijk een dilemma vormen i.v.m. met de AVG. De LCI richtlijnen '[Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg](#)' en '[Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis](#)' besteden aandacht aan dit mogelijke probleem. Wij adviseren deze richtlijnen te bekijken en indien nodig uw arbodienst/bedrijfsarts te betrekken. Voor eventuele vragen kunt u altijd met de GGD overleggen.

Overige informatie

De volgende relevante LCI richtlijnen zijn recentelijk ook bijgewerkt.

- [Uitgangspunten PBM bij WMO-ondersteuning](#)
- [Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis](#)
- [Vragen en antwoorden versoepeling van maatregelen in instellingen voor langdurige zorg na vaccinatie van de bewoners](#)

Contactgegevens GGD Brabant-Zuidoost

- Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur en za t/m zo van 09:00 – 17:00: **088 0031 595**
- Buiten kantoortijden: **0900 367 6767 (alleen voor artsen)**. Graag dit nummer alleen bij spoed bellen, niet-spoedvragen kunnen de volgende dag op bovenstaand nummer gesteld worden.
- Positieve uitslagen of overleden patiënten kunnen via zorgmail doorgegeven worden: ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl of via een beveiligde mail worden verstuurd naar infectieziekten@ggdbzo.nl Graag ontvangen wij NAW, BSN, contactgegevens (telefoonnummer indien medewerker), eerste ziektedag, datum testafname en welke test is uitgevoerd.
- De GGD vraagt de medewerker of contactpersoon om de eigen contacten te infomeren en stelt hiervoor informatiebrieven beschikbaar.
- **NB:** Voor het aanvragen van een test voor zorgmedewerkers: **0800-8101** (landelijk nummer)